

Schwangerschaftsabbrüche 2009

Erstkonsultationen	198	100%				
AR (Abruptio)	181	91%				
Keine AR bei uns	17	9%				
Nicht schwanger	4		2 Spontanaborte wurden von uns nachcurettiert			
AR (Abruptio)	181	100%				
chirurgisch	61	34%				
medikamentös	120	66%				
Wohnort/Kanton	CH	ZH	Ausland	Ausserkanton	AG	D
	174	122	7	52	11	3
	96%	67%	4%	29%		
Herkunft	CH	Ausland	D			
	83	98	29			
	46%	54%	16%			
	Mittel	Max	Min			
Alter der Schwangeren (Jahre)	29.7	49	16			
Tage Amenorrhoe bei Behandlungsbeginn	47.9	98	46			
Wartetage bis Erstkonsultation	1.5	5	0			
Wievielte Schwangerschaft	2.1	6	0			
Geburten vorher	0.6	4	0			
Abruptio vorher	0.4	4	0			
Medikamentöse Abruptio vorher	0.2	3	0			
Tage Amenorrhoe bei OP	60.6	98	46			
Wartetage bis OP	2.3	13	0			
OP am Tag der Erstkonsultation		15	25%			
Tage Amenorrhoe bei Mifegyn	41.5	54	34			
Mifegyn am Tag der ersten Konsultation		112	93%			
Cytotec-Einnahme zuhause		109	91%			
Cytotec-Einnahme in unserer Praxis		11	9%			
β-HCG Monitoring bei sehr früher SS		11	9%			
Drop Out (Nachkontrolle unbekannt)		8	7%			
Nachcurettagen		5	4%			
Die Indikation zur Operation in externem Spital war 2 mal nicht nachvollziehbar						
1 mal EUG-Verdacht: Probecurettage im Spital: intrauterine Trophoblastreste!						