

Schwangerschaftsabbrüche 2010

Erstkonsultationen	247	100%
AR (Abruptio)	219	89%
Keine AR bei uns	28	11%
Nicht schwanger	6	2 Spontanaborte: wovon eine von uns nachcurettiert

AR (Abruptio)	219	100%
chirurgisch	83	38%
medikamentös	136	62%

Wohnort/Kanton	CH	ZH	Ausland	Ausserkanton	AG	SG	ZG	D
	200	141	19	59	14	9	5	6
	91%	64%	9%		27%			

Herkunft	CH	Ausland	D
	112	107	24
	51%	49%	11%

	Mittel	Max	Min
Alter der Schwangeren (Jahre)	29.9	47.2	16.6
Tage Amenorrhoe bei Behandlungsbeginn	49.8	100	
Wartetage bis Erstkonsultation	1.9	7	0
Wievielte Schwangerschaft	2.1	9	1
Geburten vorher	0.6	4	0
Abruptio vorher	0.4	4	0
Medikamentöse Abruptio vorher	0.2	2	0

Tage Amenorrhoe bei OP	62.0	100.0	36.0
Wartetage bis OP	2.8	9.0	
OP am Tag der Erstkonsultation		15	18%

Tage Amenorrhoe bei Mifegyn	42.4	54.0	34.0
Mifegyn am Tag der ersten Konsultation		124	91%
Cytotec-Einnahme zuhause		109	80%
Cytotec-Einnahme in unserer Praxis		27	20%
β-HCG Monitoring bei sehr früher SS		8	6%
Drop Out (Nachkontrolle unbekannt)		11	8%
Nachcurettagen		4	3%

1 persistierende SS: Curettage verweigert: will in Russland?

Retention von 26 mm; Patientin wandert aus: sofortige Nachcurettage ohne weiteres Abwarten

Eine Patientin wurde wegen Blutungen ohne Anämisierung extern operiert