

Schwangerschaftsabbrüche 2011

Erstkonsultationen	254	100%		
AR (Abruptio)	231	91%		
Keine AR bei uns	23	9%		
Nicht schwanger	3		2 Spontanaborte: wovon eine von uns nachcurettiert	
AR (Abruptio)	231	100%		
chirurgisch	86	37%		
medikamentös	145	63%		
Wohnort/Kanton	CH	ZH	Ausland	Ausserkanton
	218	141	12	65
	94%	65%	6%	30%
Herkunft	CH	Ausland	D	
	122	108	21	
	53%	47%	9%	
	Mittel	Max	Min	
Alter der Schwangeren (Jahre)	30.3	46.2	15.6	
Tage Amenorrhoe bei Behandlungsbeginn	51.1	96	35 (*)	
* in 5 Fällen wurde noch keine Frucht mit Ultraschall gesehen:	Monitorisierung der Behandlung mit β -HCG			
Wievielte Schwangerschaft	2.1	10	1	
Geburten vorher	0.6	6	0	
Abruptio vorher	0.5	5	0	
Medikamentöse Abruptio vorher	0.2	5	0	
Tage Amenorrhoe bei OP	64.9	96	34	
Wartetage bis OP	3.4			
OP am Tag der Erstkonsultation		25	29%	
Tage Amenorrhoe bei Mifegyn	42.9	60	35	
Mifegyn am Tag der ersten Konsultation		129	89%	
Cytotec-Einnahme zuhause		126	87%	
Cytotec-Einnahme in unserer Praxis		19	13%	
β -HCG Monitoring bei sehr früher SS		5	3%	
Drop Out (Nachkontrolle unbekannt)		4	3%	
Nachcurettagen		3	2%	

